


Введение


Современная космология

- Классическая космология (А.А. Фридман, В. Де Ситтер, Э. Хаббл, 1920-е)
- Теория космологических возмущений (И.М. Лифшиц, 1940-е)
- Инфляционная космология (А.А. Старобинский, А. Гус (Guth), А.Д. Линде, конец 1970-х - начало 1980-х)

РЕЛИКТ - январь 1992



СОВЕ - апрель 1992



Литература

- Д.С. Горбунов, В.А. Рубаков. Введение в теорию ранней вселенной (два тома).
- А. Лайтман, В. Пресс, Р. Прайс, С. Тюкольски. Сборник задач по теории относительности и гравитации.

Как устроен курс


Презентации в сети: dec1.sinp.msu.ru/~panov

Coded in UTF-8

Панов Александр Дмитриевич

НИИЯФ МГУ, доктор физ.-мат. наук, ведущий
научный сотрудник.

E-mail: panov@dec1.sinp.msu.ru



Введение в современную космологию. Курс лекций.

Книги, к которым я имею какое-то отношение:
сканировал, редактировал, переводил и т.д.

Библиотека.

Все формулы пронумерованы!

Проверить вычисления: ★

Наука космология – не вполне обычна

- Научный метод: наблюдаемость и воспроизводимость
- Аппарат космологии описывает «ансамбль одинаковых вселенных», не единичную Вселенную
- Вселенная – уникальный объект
- Операционально неопределенное понятие вероятности – байесовская вероятность
- Cosmic variance – космическая неопределенность
⇒ некоторые предсказания в принципе не могут быть проверены с любой наперед заданной точностью.
- Мультиверс.

Лекция 1

Основы ОТО. I.

Дифференциальная геометрия: метрический тензор, афинная связность, ковариантная производная

- Движение тел в гравитационном поле не зависит от природы тел \Rightarrow
- Принцип эквивалентности \Rightarrow
- Гравитация есть явление геометрическое

Постулат: Движение в гравитационном поле есть свободное движение по геодезической линии искривленного пространства-времени

- ОТО – теория гравитации скалярной материи.

Два метода дифференциальной геометрии:

1. Координатный
2. Ковариантно-геометрический (дифференциальные формы, внешнее дифференцирование)

Координаты x^μ , $\mu = 0, 1, 2, 3$ произвольным образом локально помечают точки (события) пространства-времени.

Квадрат интервала (суммирование по одинаковым верхним и нижним индексам):

$$ds^2 = g_{\mu\nu} dx^\mu dx^\nu \quad (1.1)$$

$g_{\mu\nu}$ – метрический тензор.

Квадрат интервала есть фундаментальный инвариант – не зависит от того, в каких координатах мы работаем.

Интервал измеряется в единицах длины, но метрический тензор и координаты не имеют определенной размерности!

Размерности вообще и размерности s , $g_{\mu\nu}$ и x^μ в частности

$$\hbar = c = k_B = 1 \quad (1.2)$$

$$E = mc^2; E = k_B T; \omega = E/\hbar; p = cE; p = \hbar k \Rightarrow [m] = [T] = [\omega] = [p] = [k] = [E] \quad (1.3)$$

Единица измерения энергии – ГэВ.

Переводные коэффициенты вычисляются подбором степеней c, \hbar, k_B .

Примеры:

$$[E] = [\hbar\omega] = \left[\frac{\hbar}{t} \right] \Rightarrow [t] = \frac{[\hbar]}{[E]} \Rightarrow \quad (1.4)$$

$$t(\text{GeV}^{-1}) = \frac{1.05 \cdot 10^{-27} \text{ эрг} \cdot \text{с}}{10^9 \cdot 1.6 \cdot 10^{-12} \text{ эрг}} \approx 6.6 \cdot 10^{-25} \text{ с} \quad (1.5)$$

$$l(\text{GeV}^{-1}) = \frac{1.05 \cdot 10^{-27} \text{ эрг} \cdot \text{с} \times 3 \cdot 10^{10} \text{ см} \text{с}^{-1}}{10^9 \cdot 1.6 \cdot 10^{-12} \text{ эрг}} \approx 2.0 \cdot 10^{-14} \text{ см} \quad (1.6)$$

Таблица преобразования размерностей

Энергия	$1 \text{ ГэВ} = 1.602\text{e-}03 \text{ эрг}$
Масса	$1 \text{ ГэВ} = 1.783\text{e-}24 \text{ г}$
Температура	$1 \text{ ГэВ} = 1.161\text{e+}13 \text{ К}$
Длина	$1 \text{ ГэВ}^{-1} = 1.973\text{e-}14 \text{ см}$
Время	$1 \text{ ГэВ}^{-1} = 6.582\text{e-}25 \text{ с}$
Плотность числа частиц	$1 \text{ ГэВ}^3 = 1.301\text{e+}41 \text{ см}^{-3}$
Плотность энергии	$1 \text{ ГэВ}^4 = 2.085\text{e+}38 \text{ эрг}\cdot\text{см}^{-3}$
Плотность массы	$1 \text{ ГэВ}^4 = 2.320\text{e+}17 \text{ г}\cdot\text{см}^{-3}$


Энергия	$1 \text{ эрг} = 6.241\text{e+}02 \text{ ГэВ}$
Масса	$1 \text{ г} = 5.609\text{e+}23 \text{ ГэВ}$
Температура	$1 \text{ К} = 8.617\text{e-}14 \text{ ГэВ}$
Длина	$1 \text{ см} = 5.068\text{e+}13 \text{ ГэВ}^{-1}$
Время	$1 \text{ с} = 1.519\text{e+}24 \text{ ГэВ}^{-1}$
Плотность числа частиц	$1 \text{ см}^{-3} = 7.684\text{e-}42 \text{ ГэВ}^3$
Плотность энергии	$1 \text{ эрг}\cdot\text{см}^{-3} = 4.796\text{e-}39 \text{ ГэВ}^4$
Плотность массы	$1 \text{ г}\cdot\text{см}^{-3} = 4.310\text{e-}18 \text{ ГэВ}^4$

Формализм ковариантен относительно произвольной (гладкой) замены координат (диффеоморфизм):

$$x'^\mu = x^\mu(x) \quad (1.7)$$

Ковариантность достигается за счет использования объектов, преобразующихся специальным образом.

Скаляры – не преобразуются:



$$\varphi'(x') = \varphi(x) \quad (1.8)$$

Контравариантные векторы преобразуются как дифференциалы координат

$$x'^\mu = x^\nu(x^\mu) \quad (1.9)$$

$$dx'^\mu = \frac{\partial x'^\mu}{\partial x^\nu} dx^\nu \quad (1.10)$$

$$A'^\mu = \frac{\partial x'^\mu}{\partial x^\nu} A^\nu \quad (1.11)$$

Ковариантные векторы преобразуются как производные скаляра

$$B_\mu = \frac{\partial \varphi}{\partial x^\mu} \Rightarrow B'_\mu = \frac{\partial \varphi}{\partial x'^\mu} = \frac{\partial \varphi}{\partial x^\nu} \frac{\partial x^\nu}{\partial x'^\mu} = \frac{\partial x^\nu}{\partial x'^\mu} B_\nu \quad (1.12)$$

Построение скаляров из векторов:

$$A'^\mu B'_\mu = \frac{\partial x'^\mu}{\partial x^\sigma} A^\sigma \frac{\partial x^\rho}{\partial x'_\mu} B_\rho = \delta_\sigma^\rho A^\sigma B_\rho = A^\rho B_\rho \quad (1.13)$$

$\Rightarrow A^\mu B_\mu$ – инвариант (правило Эйнштейна!).

Производная по направлению скалярной функции – инвариант:

$$\partial_A \varphi = \left(A^\mu \frac{\partial}{\partial x^\mu} \right) \varphi = A^\mu \frac{\partial \varphi}{\partial x^\mu} \equiv A^\mu \partial_\mu \varphi \quad (1.14)$$

Многомерные тензоры (по определению) преобразуются как произведения координат векторов:

$$B'_{\nu\lambda} = \frac{\partial x'^\mu}{\partial x^\rho} \frac{\partial x^\sigma}{\partial x'^\nu} \frac{\partial x^\tau}{\partial x'^\lambda} B_\sigma^\rho \quad (1.15)$$

Для символа Кронекера: $\delta'_\nu^\mu = \delta_\nu^\mu \star$.

Свертка по верхнему и нижнему индексу уменьшает размерность тензора на 2:

$$A'^\mu = \frac{\partial x'^\mu}{\partial x^\rho} \frac{\partial x^\sigma}{\partial x'^\mu} A_\sigma^\rho = \delta_\rho^\sigma A_\sigma^\rho = A_\sigma^\sigma \quad (1.16)$$

(вообще не осталось индексов, скаляр)

Почему метрический тензор - тензор?

$$\begin{aligned} ds^2 &= g_{\mu\nu} dx^\mu dx^\nu = g_{\mu\nu} \frac{\partial x^\mu}{\partial x'^\sigma} dx'^\sigma \frac{\partial x^\nu}{\partial x'^\rho} dx'^\rho = \\ &= ds'^2 = g'_{\sigma\rho} dx'^\sigma dx'^\rho \end{aligned} \quad (1.17)$$

$$\Rightarrow g'_{\sigma\rho} = \frac{\partial x^\mu}{\partial x'^\sigma} \frac{\partial x^\nu}{\partial x'^\rho} g_{\mu\nu} \quad (1.18)$$

Обобщение: Если \forall тензора A_ν^μ

$$C_\lambda^\mu = A_\nu^\mu B_\lambda^\nu - \quad (1.19)$$

тензор, то и B_λ^ν - тензор (и т.д.)

Доказательство

$$C'_\lambda^\mu = \frac{\partial x'^\mu}{\partial x^\rho} \frac{\partial x^\sigma}{\partial x'^\lambda} A_\nu^\rho B_\sigma^\nu \quad (1.20)$$

$$\begin{aligned} C'_\lambda^\mu &= A'_\nu^\mu B'_\lambda^\nu = \frac{\partial x'^\mu}{\partial x^\rho} \frac{\partial x^\sigma}{\partial x'^\nu} A_\sigma^\rho B'_\lambda^\nu = \\ &= \frac{\partial x'^\mu}{\partial x^\rho} \frac{\partial x^\nu}{\partial x'^\sigma} A_\nu^\rho B'_\lambda^\sigma \Rightarrow \end{aligned} \quad (1.21)$$

$$\frac{\partial x'^\mu}{\partial x^\rho} \frac{\partial x^\sigma}{\partial x'^\lambda} B_\sigma^\nu = \frac{\partial x'^\mu}{\partial x^\rho} \frac{\partial x^\nu}{\partial x'^\sigma} B'_\lambda^\sigma \Rightarrow \quad (1.22)$$

$$\frac{\partial x^\sigma}{\partial x'^\lambda} B_\sigma^\nu = \frac{\partial x^\nu}{\partial x'^\sigma} B'_\lambda^\sigma \quad \left| \frac{\partial x'^\alpha}{\partial x^\nu} \right. \Rightarrow \quad (1.23)$$

$$B'_\lambda^\alpha = \frac{\partial x'^\alpha}{\partial x^\nu} \frac{\partial x^\sigma}{\partial x'^\lambda} B_\sigma^\nu \quad (1.24)$$

Следствие: Величина, задаваемая обратной матрицей к метрическому тензору, сама тензор:

$$g^{\mu\nu} g_{\nu\lambda} = \delta_\lambda^\mu \Rightarrow g^{\mu\nu} - \text{тензор} \quad (1.25)$$

Поднятие и опускание индексов

Если A^μ – контравариантный вектор, то

$$A_\mu = g_{\mu\nu} A^\nu \quad (1.26)$$

– ковариантный вектор.

И наоборот:

$$A^\mu = g^{\mu\nu} A_\nu \quad (1.27)$$

Инвариантный объем

$$g'_{\mu\nu} = \frac{\partial x^\rho}{\partial x'^\mu} g_{\rho\sigma} \frac{\partial x^\sigma}{\partial x'^\nu} \quad (1.28)$$


$$\hat{J} = (J_\mu^\rho) = \left(\frac{\partial x^\rho}{\partial x'^\mu} \right)^{\leftarrow \text{столбец}}_{\leftarrow \text{строка}} \equiv \left(\frac{\partial x}{\partial x'} \right) \quad (1.29)$$

$$\hat{g}' = \hat{J} \hat{g} \hat{J}^T \quad (1.30)$$

$$g \equiv \det \hat{g}; \quad J \equiv \det \hat{J} \quad (1.31)$$

$$g' = J^2 g \Rightarrow J = \sqrt{\frac{g'}{g}} \quad (1.32)$$

маленький
объем,
почти
плоский



Элемент объема - это геометрическое понятие,
инвариант!

$$V = \int_{\Omega} d^4x; \quad V' = \int_{\Omega} d^4x' \quad (1.33)$$

$$V \neq V' \quad (1.34)$$

$$\begin{aligned} V &= \int_{\Omega} d^4x = \int_{\Omega} \left(\frac{\partial x}{\partial x'} \right) d^4x' = \int_{\Omega} \sqrt{\frac{g'}{g}} d^4x' = \\ &= \sqrt{\frac{g'}{g}} \int_{\Omega} d^4x' = \sqrt{\frac{g'}{g}} V' \Rightarrow \end{aligned} \quad (1.35)$$

$$V = \sqrt{\frac{g'}{g}} V' \Rightarrow V \sqrt{-g} = V' \sqrt{-g'} \quad (1.36)$$

$\sqrt{-g} d^4x$ – инвариантный элемент объема

Инвариантный элемент объема – инвариантная мера интегрирования, но не объем в физическом смысле!

$$[g_{\mu\nu} dx^\mu dx^\nu] = [L^2]$$

$$[\sqrt{-g} dx] = [L]$$

$$[d^3x] = [\text{любая размерность}] \Rightarrow$$

$$[\sqrt{-g} d^4x] = [\text{любая размерность}]$$

Ковариантные производные

$$(\partial_\mu \varphi)' = \frac{\partial \varphi'}{\partial x'_\mu} = \frac{\partial \varphi}{\partial x^\nu} \frac{\partial x^\nu}{\partial x'^\mu} = \frac{\partial x^\nu}{\partial x'^\mu} \partial_\nu \varphi \quad (1.37)$$

– производная скаляра преобразуется как вектор.

$$\begin{aligned} (\partial_\mu A^\nu)' &= \frac{\partial}{\partial x'^\mu} A''^\nu = \frac{\partial}{\partial x'^\mu} \left(\frac{\partial x'^\nu}{\partial x^\alpha} A^\alpha \right) = \\ &= \frac{\partial}{\partial x'^\mu} \left(\frac{\partial x'^\nu}{\partial x^\alpha} \right) A^\alpha + \frac{\partial x'^\nu}{\partial x^\alpha} \frac{\partial x^\beta}{\partial x'^\mu} \frac{\partial A^\alpha}{\partial x^\beta} = \\ &= \frac{\partial x^\beta}{\partial x'^\mu} \cdot \frac{\partial^2 x'^\nu}{\partial x^\beta \partial x^\alpha} A^\alpha + \frac{\partial x'^\nu}{\partial x^\alpha} \frac{\partial x^\beta}{\partial x'^\mu} \partial_\beta A^\alpha \quad (1.38) \end{aligned}$$


Производная вектора преобразуется как тензор плюс еще какая-то добавка.

Параллельный перенос

Хотим ковариантную производную:

$$\begin{cases} (\nabla_m A^\nu)' = \frac{\partial x^\alpha}{\partial x'^\mu} \frac{\partial x'^\nu}{\partial x^\beta} \nabla_\alpha A^\beta \\ \nabla_\mu \varphi = \partial_\mu \varphi \end{cases} \quad (1.39)$$

Проблема: Помимо изменения поля «самого по себе» есть еще добавка, связанная с изменением компонент поля из-за криволинейности системы координат.



Сначала параллельно перенести $A^\mu(x)$ в точку \tilde{x} , а потом сравнить с $A^\mu(\tilde{x})$! Перенос:

$$\tilde{A}^\mu(\tilde{x}) = A^\mu(x) - \Gamma_{\nu\lambda}^\mu A^\nu dx^\lambda \quad (1.40)$$

$\Gamma_{\nu\lambda}^\mu$ – коэффициенты аффинной связности

- Вообще говоря, определены совершенно независимо от $g_{\mu\nu}$!

$$\begin{aligned} A^\mu(\tilde{x}) - \tilde{A}^\mu(\tilde{x}) &= A^\mu(\tilde{x}) - [A^\mu(x) - \Gamma_{\nu\lambda}^\mu A^\nu dx^\lambda] = \\ &= \partial_\lambda A^\mu dx^\lambda + \Gamma_{\nu\lambda}^\mu A^\nu dx^\lambda = \\ &= (\partial_\lambda A^\mu + \Gamma_{\nu\lambda}^\mu A^\nu) dx^\lambda \equiv \nabla_\lambda A^\mu dx^\lambda \quad (1.41) \end{aligned}$$

$$\nabla_\lambda A^\mu = \partial_\lambda A^\mu + \Gamma_{\nu\lambda}^\mu A^\nu \quad (1.42)$$

Требуем, чтобы $\nabla_\lambda A^\mu$ был тензором!

Это будет определять закон преобразования $\Gamma_{\nu\lambda}^\mu$.

$$\nabla_\lambda B_\mu = ?$$

Скаляр не меняется при параллельном переносе:

$$\tilde{A}^\mu(\tilde{x})\tilde{B}_\mu(\tilde{x}) = A^\mu(x)B_\mu(x) \quad (1.43)$$

$$[A^\mu(x) - \Gamma_{\nu\lambda}^\mu A^\nu dx^\lambda] \tilde{B}_\mu(\tilde{x}) = A^\mu(x)B_\mu(x) \Rightarrow \quad (1.44)$$

$$\begin{aligned} A^\mu(x)[\tilde{B}_\mu(\tilde{x}) - B_\mu(x)] &= \Gamma_{\nu\lambda}^\mu A^\nu dx^\lambda \tilde{B}_\mu(\tilde{x}) \cong \\ &\cong \Gamma_{\nu\lambda}^\mu A^\nu dx^\lambda B_\mu(x) = \Gamma_{\mu\lambda}^\nu A^\mu dx^\lambda B_\nu \Rightarrow \quad (1.45) \end{aligned}$$

$$\tilde{B}_\mu(\tilde{x}) = B_\mu(x) + \Gamma_{\mu\lambda}^\nu dx^\lambda B_\nu \quad (1.46)$$

$$B_\mu(\tilde{x}) - \tilde{B}_\mu(\tilde{x}) = (\partial_\lambda B_\mu - \Gamma_{\mu\lambda}^\nu B_\nu) dx^\lambda \Rightarrow \quad (1.47)$$

$$\boxed{\nabla_\lambda B_\mu = \partial_\lambda B_\mu - \Gamma_{\mu\lambda}^\nu B_\nu} \quad (1.48)$$

Правило Лейбница (легко проверяется \star):


$$\nabla_\lambda(A^\mu B_\nu) = (\nabla_\lambda A^\mu)B_\nu + A^\mu(\nabla_\lambda B_\nu) \quad (1.49)$$

Правило дифференцирования тензоров высшего ранга следует из правила Лейбница:

$$\begin{aligned} \nabla_\lambda(A^\mu B_\nu) &= (\partial_\lambda A^\mu + \Gamma_{\lambda\sigma}^\mu A^\sigma)B_\nu + A^\mu(\partial_\lambda B_\nu - \Gamma_{\lambda\nu}^\sigma B_\sigma) = \\ &= \partial_\lambda(A^\mu B_\nu) + \Gamma_{\lambda\sigma}^\mu(A^\sigma B_\nu) - \Gamma_{\lambda\nu}^\sigma(A^\mu B_\sigma) \Rightarrow \quad (1.50) \end{aligned}$$

$$\boxed{\nabla_\lambda C_\nu^\mu = \partial_\lambda C_\nu^\mu + \Gamma_{\lambda\sigma}^\mu C_\nu^\sigma - \Gamma_{\lambda\nu}^\sigma C_\sigma^\mu} \quad (1.51)$$

Геодезические



Геодезическая линия – такая кривая, вдоль которой касательный вектор к ней переносится параллельно самому себе.

$$u^\mu(\tau + d\tau) = u^\mu + \frac{du^\mu(\tau)}{d\tau} d\tau \quad (1.52)$$

$$\begin{aligned} u^\mu(\tau + d\tau) &= \tilde{u}^\mu(\tau + d\tau) = u^\mu(\tau) - \Gamma_{\nu\lambda}^\mu u^\nu(\tau) dx^\lambda = \\ &= u^\mu(\tau) - \Gamma_{\nu\lambda}^\mu u^\nu(\tau) u^\lambda(\tau) d\tau \Rightarrow \quad (1.53) \end{aligned}$$

$$\frac{du^\mu}{d\tau} d\tau = -\Gamma_{\nu\lambda}^\mu u^\nu(\tau) u^\lambda(\tau) d\tau \Rightarrow \quad (1.54)$$

$$\boxed{\frac{du^\mu}{d\tau} + \Gamma_{\nu\lambda}^\mu u^\nu u^\lambda = 0} \quad (1.55)$$

Меняем местами ν и λ и складываем:

$$\frac{du^\mu}{d\tau} + \frac{1}{2} (\Gamma_{\nu\lambda}^\mu + \Gamma_{\lambda\nu}^\mu) u^\nu u^\lambda = 0 \quad (1.56)$$

$$\frac{du^\mu}{d\tau} + \Gamma_{\{\nu\lambda\}}^\mu u^\nu u^\lambda = 0 \quad (1.57)$$

$$\Gamma_{\{\nu\lambda\}}^\mu = \frac{1}{2} (\Gamma_{\nu\lambda}^\mu + \Gamma_{\lambda\nu}^\mu) \quad (1.58)$$

Геодезические определяются симметризованными коэффициентами связности.

Являются ли коэффициенты связности на самом деле симметричными?

Метричность связности

Хотим, чтобы операции поднятия/опускания индексов была универсальной:

$$g_{\mu\nu} \nabla_\lambda A^\nu = \nabla_\lambda A_\mu; \quad A_\mu = g_{\mu\nu} A^\nu \text{ т.е.} \quad (1.59)$$

$$g_{\mu\nu} (\nabla_\lambda A^\nu) = \nabla_\lambda (g_{\mu\nu} A^\nu) \quad (1.60)$$

По правилу Лейбница:

$$\begin{aligned} \nabla_\lambda (g_{\mu\nu} A^\nu) &= (\nabla_\lambda g_{\mu\nu}) A^\nu + g_{\mu\nu} (\nabla_\lambda A^\nu) = \\ &= g_{\mu\nu} (\nabla_\lambda A^\nu) \Rightarrow \end{aligned} \quad (1.61)$$

$$\boxed{\nabla_\lambda g_{\mu\nu} = 0} \quad (1.62)$$

Метрический тензор ковариантно постоянен, если связность метрична.

Закон преобразования афинных связностей

$$\nabla_\lambda A^\mu = \partial_\lambda A^\mu + \Gamma_{\lambda\nu}^\mu A^\nu \quad (1.63)$$

$$\begin{aligned} (\nabla_\lambda A^\mu)' &= \frac{\partial x^\alpha}{\partial x'^\lambda} \frac{\partial x'^\mu}{\partial x^\beta} (\nabla_\alpha A^\beta) = \\ &= \frac{\partial x^\alpha}{\partial x'^\lambda} \frac{\partial x'^\mu}{\partial x^\beta} (\partial_\alpha A^\beta + \Gamma_{\alpha\gamma}^\beta A^\gamma) \end{aligned} \quad (1.64)$$

$$\begin{aligned} (\nabla_\lambda A^\mu)' &= \frac{\partial A'^\mu}{\partial x'^\lambda} + \Gamma'_{\lambda\gamma}^\mu A'^\gamma = \\ &= \frac{\partial}{\partial x'^\lambda} \left(\frac{\partial x'^\mu}{\partial x^\alpha} A^\alpha \right) + \Gamma'_{\lambda\gamma}^\mu \frac{\partial x'^\gamma}{\partial x^\delta} A^\delta = \\ &= \frac{\partial}{\partial x'^\lambda} \left(\frac{\partial x'^\mu}{\partial x^\alpha} \right) A^\alpha + \frac{\partial x'^\mu}{\partial x^\alpha} \frac{\partial A^\alpha}{\partial x'^\lambda} + \Gamma'_{\lambda\gamma}^\mu \frac{\partial x'^\gamma}{\partial x^\delta} A^\delta = \\ &= \frac{\partial x^\beta}{\partial x'^\lambda} \frac{\partial^2 x'^\mu}{\partial x^\beta \partial x^\alpha} A^\alpha + \frac{\partial x'^\mu}{\partial x^\alpha} \frac{\partial x^\beta}{\partial x'^\lambda} \frac{\partial A^\alpha}{\partial x^\beta} + \Gamma'_{\lambda\gamma}^\mu \frac{\partial x'^\gamma}{\partial x^\delta} A^\delta = \\ &= \frac{\partial x^\alpha}{\partial x'^\lambda} \frac{\partial x'^\mu}{\partial x^\beta} \frac{\partial A^\beta}{\partial x^\alpha} + \frac{\partial x^\alpha}{\partial x'^\lambda} \frac{\partial x'^\mu}{\partial x^\beta} \Gamma_{\alpha\gamma}^\beta A^\gamma \end{aligned} \quad (1.65)$$

$$\Gamma_{\alpha\gamma}^\beta \frac{\partial x^\alpha}{\partial x'^\lambda} \frac{\partial x'^\mu}{\partial x^\beta} A^\gamma = \frac{\partial x^\beta}{\partial x'^\lambda} \frac{\partial^2 x'^\mu}{\partial x^\beta \partial x^\alpha} A^\alpha + \Gamma'_{\lambda\gamma}^\mu \frac{\partial x'^\gamma}{\partial x^\delta} A^\delta \quad (1.66)$$

$$A^\gamma, A^\alpha, A^\delta \rightarrow A^\varepsilon$$

$$\Gamma_{\alpha\varepsilon}^\beta \frac{\partial x^\alpha}{\partial x'^\lambda} \frac{\partial x'^\mu}{\partial x^\beta} = \frac{\partial x^\beta}{\partial x'^\lambda} \frac{\partial^2 x'^\mu}{\partial x^\beta \partial x^\varepsilon} + \Gamma'_{\lambda\gamma}^\mu \frac{\partial x'^\gamma}{\partial x^\varepsilon} \left| \frac{\partial x^\varepsilon}{\partial x'^\delta} \right. \quad (1.67)$$

$$\Gamma'{}^\mu_{\lambda\delta} = \frac{\partial x^\alpha}{\partial x'^\lambda} \frac{\partial x'^\mu}{\partial x^\beta} \frac{\partial x^\varepsilon}{\partial x'^\delta} \Gamma^\beta_{\alpha\varepsilon} - \frac{\partial x^\beta}{\partial x'^\lambda} \frac{\partial x^\varepsilon}{\partial x'^\delta} \frac{\partial^2 x'^\mu}{\partial x^\beta \partial x^\varepsilon} \quad (1.68)$$

$$\frac{\partial x'^\mu}{\partial x^\sigma} \frac{\partial^2 x^\sigma}{\partial x'^\nu \partial x'^\lambda} + \frac{\partial x^\beta}{\partial x'^\lambda} \frac{\partial x^\varepsilon}{\partial x'^\beta} \frac{\partial^2 x'^\mu}{\partial x^\beta \partial x^\varepsilon} \equiv 0 \quad \star \quad (1.69)$$

$$\Gamma'{}^\mu_{\lambda\delta} = \frac{\partial x^\alpha}{\partial x'^\lambda} \frac{\partial x'^\mu}{\partial x^\beta} \frac{\partial x^\varepsilon}{\partial x'^\delta} \Gamma^\beta_{\alpha\varepsilon} + \frac{\partial x'^\mu}{\partial x^\sigma} \frac{\partial^2 x^\sigma}{\partial x'^\delta \partial x'^\lambda} \quad (1.70)$$

Афинная связность – не тензор!

Кручение

$$C^\alpha_{\beta\gamma} = \Gamma^\alpha_{\beta\gamma} - \Gamma^\alpha_{\gamma\beta} \quad (1.71)$$

Преобразуется как тензор.