


Лекция 5

Горизонт Де Ситтера и модели с кривизной. Зоопарк космологических моделей. Параметр замедления, стандартные свечи и темная энергия. Модель ΛCDM и три основные эпохи Вселенной. Возраст вселенной

Де Ситтеровский горизонт

Каков в момент времени t_0 размер области, из которой дойдут сигналы в точку $x = 0$ к моменту $t > t_0$?



$$\begin{aligned} l_{dS}(t) &= a(t_0) \int_{t_0}^t \frac{dt'}{a(t')} = \\ &= \text{const} \times e^{H_{dS} t_0} \int_{t_0}^t \frac{dt'}{\text{const} \times e^{H_{dS} t'}} = \\ &= \frac{1}{H_{dS}} \left[1 - e^{-H_{dS}(t-t_0)} \right] \quad (5.1) \end{aligned}$$

$$l_{dS}(\infty) = \frac{1}{H_{dS}} \quad (5.2)$$

Сигналы из областей, которые сейчас дальше $l_{dS}(\infty)$ не дойдут до точки $x = 0$ никогда!

$$H_{dS} = \sqrt{\frac{8\pi}{3} G \Lambda} \quad (5.3)$$

$$\Lambda = 3.39 \text{ GeV/m}^3 = 2.60 \cdot 10^{-47} \text{ GeV}^2$$

$$M_{Pl} = \sqrt{\frac{\hbar c}{G}} = 1.2209 \cdot 10^{19} \text{ GeV} = 2.2 \cdot 10^{-5} \text{ g} \quad (5.4)$$

$$G = M_{Pl}^{-2} = 6.71 \cdot 10^{-39} \text{ GeV}^{-2}$$

$$H_{dS} = 1.21 \cdot 10^{-42} \text{ GeV}$$

$$l_{dS} = 8.27 \cdot 10^{41} \text{ GeV}^{-1} = 17.3 \cdot 10^9 \text{ ly}$$

```
void Do()
{
    double cm = 5.068e13; // GeV^-1
    double Lambda = 0.691*4.9e-6; // GeV/cm^3
    printf("Lambda = %g GeV/cm^3\n", Lambda);
    Lambda /= pow(cm, 3); // GeV^4
    printf("Lambda = %g GeV^2\n", Lambda);
    double MP1 = 1.2209e19; // GeV
    double G = 1/MP1/MP1; // GeV^-2
    printf("G = MP1^-2 = %g GeV^-2\n", G);
    double HdS = sqrt(8.*TMath::Pi()/3.0*G*Lambda); // GeV
    printf("HdS = %g GeV\n", HdS);
    double LdS = 1/HdS; // GeV^-1
    printf("LdS = %g GeV^-1\n", LdS);
    LdS /= cm; // cm
    double Ly = 9.46e17; // cm
    LdS /= Ly; // light years
    printf("LdS = %g ly\n", LdS);
}
```

Случай $\kappa = +1, -1$

Пылевидная материя, $\Lambda = 0$. Из (4.41):

$$\rho = \frac{\text{const}}{a^3} \quad (5.5)$$


$$\left(\frac{\dot{a}}{a}\right)^2 = \frac{8\pi G}{3} \frac{\text{const}}{a^3} - \frac{\kappa}{a^2} = \frac{a_{max}}{a^3} - \frac{\kappa}{a^2} \quad (5.6)$$

$$dt = a(t)d\eta \Rightarrow \left(\frac{da}{d\eta}\right)^2 = a_{max}a - \kappa a^2 \quad (5.7)$$


$\kappa = +1$

$$a(\eta) = a_{max} \sin^2 \frac{\eta}{2} \quad (5.8)$$

Вселенная рождается в точке и коллапсирует в точку.



$$t = \int_0^\eta a(\eta)d\eta = \frac{a_{max}}{2}(\eta - \sin \eta) \quad (5.9)$$



Для $\kappa = +1$ можно явно выразить a_{max} через массу вселенной:

$$\frac{8\pi G}{3}\rho = \frac{a_{max}}{a^3} \quad (\text{по определению, см. (5.6)}) \quad (5.10)$$

Объем поверхности трехмерной сферы: $2\pi^2 a^3$

$$\rho \times 2\pi^2 a^3 = m \Rightarrow \rho = \frac{m}{2\pi^2 a^3} \quad (5.11)$$


$$\frac{8\pi G}{3} \frac{m}{2\pi^2 a^3} = \frac{a_{max}}{a^3} \Rightarrow a_{max} = \frac{4}{3\pi} mG \quad (5.12)$$

$\varkappa = -1$


$$a(\eta) = a_{max} \operatorname{sh}^2 \frac{\eta}{2} \quad (5.13)$$

$$t = \int_0^\eta a(\eta) d\eta = \frac{a_{max}}{2} (\operatorname{sh} \eta - \eta) \quad (5.14)$$

Коллапса нет, вселенная открыта и бесконечна.
 a_{max} не имеет смысла максимального размера.



Зоопарк космологических моделей



И.Д. Новиков. Космологические модели. Физическая энциклопедия, Т.2, стр. 475

★ Найдите асимптотику решения при $t \rightarrow \infty$.

Параметр замедления (или как была открыта темная энергия)

$$q_0 = -\frac{1}{H_0^2} \frac{\ddot{a}}{a} \Big|_{t_0} = -\frac{\ddot{a}}{\dot{a}^2} \quad (5.15)$$

Пыль:

$$\begin{aligned} a(t) &= \text{const } t^{2/3} \\ \dot{a}(t) &= \frac{2}{3} \text{const } t^{-1/3} \\ \ddot{a}(t) &= -\frac{2}{9} \text{const } t^{-4/3} \end{aligned} \quad (5.16)$$

$$q_0 = +\frac{1}{2} \quad (5.17)$$

Каков параметр замедления в более общем случае?
(И в чем заключается этот более общий случай)?

Критическая плотность

Уравнение Фридмана:

$$H^2(t) = \left(\frac{\dot{a}}{a}\right)^2 = \frac{8\pi}{3} G(\rho + \Lambda) - \frac{\kappa}{a^2} \quad (5.18)$$

\Rightarrow Постоянная Хаббла сейчас:

$$H_0^2 = \frac{8\pi}{3} G(\rho_0 + \Lambda) - \frac{\kappa}{a_0^2} \quad (5.19)$$

Если пространство плоское, $\kappa = 0$, то

$$\frac{8\pi}{3} G(\rho_0 + \Lambda) = H_0^2 \Rightarrow \rho_0 + \Lambda = \frac{3}{8\pi G} H_0^2 \quad (5.20)$$

$\rho_c \equiv \frac{3}{8\pi G} H_0^2 \quad - \text{ критическая плотность}$

(5.21)

$$\begin{aligned} h &= 0.68 \Rightarrow \\ \rho_c &= 4.9 \cdot 10^{-6} \frac{\Gamma_\text{ЭВ}}{\text{см}^3} = 4.9 \frac{\Gamma_\text{ЭВ}}{\text{м}^3} \end{aligned} \quad (5.22)$$

$\rho_0 + \Lambda$ измеряются.

Результат: в пределах ошибок

$$\rho_0 + \Lambda = \rho_c \Rightarrow \quad (5.23)$$

Наше пространство очень близко к плоскому.

Из (5.18):

$$\begin{aligned} H^2 &= \frac{8\pi}{3} G(\rho + \Lambda) - \frac{\kappa}{a^2} = \\ &= \frac{8\pi}{3} G \left(\rho_M + \rho_{rad} + \rho_\Lambda - \frac{3}{8\pi G} \frac{\kappa}{a^2} \right) = \\ &= \frac{8\pi}{3} G (\rho_M + \rho_{rad} + \rho_\Lambda + \rho_K) \end{aligned} \quad (5.24)$$

Уравнение справедливо всегда, когда можно пренебречь плавным превращением ультрарелятивистской материи в нерелятивистскую \Rightarrow

Всегда, кроме очень ранних эпох после сингулярности.

Из (5.24):

$$\rho_M + \rho_{rad} + \rho_\Lambda + \rho_K = \frac{3}{8\pi G} H^2 \quad (5.25)$$

Из (5.25), для современной эпохи (по определению (5.21))

$$\rho_M^0 + \rho_{rad}^0 + \rho_\Lambda^0 + \rho_K^0 = \rho_c \quad (5.26)$$

Введем относительные плотности *сейчас*:

$$\Omega_M = \rho_M^0 / \rho_c \quad (5.27)$$

$$\Omega_{rad} = \rho_{rad}^0 / \rho_c \quad (5.28)$$

$$\Omega_\Lambda = \rho_\Lambda^0 / \rho_c \quad (5.29)$$

$$\Omega_K = \rho_K^0 / \rho_c \quad (5.30)$$

$$\Omega_M + \Omega_{rad} + \Omega_\Lambda + \Omega_K = 1 \quad (5.31)$$

$$\rho_M = \rho_M^0 \left(\frac{a_0}{a} \right)^3 \quad (5.32)$$

$$\rho_{rad} = \rho_{rad}^0 \left(\frac{a_0}{a} \right)^4 \quad (5.33)$$

$$\rho_\Lambda = \rho_\Lambda^0 \equiv \Lambda \quad (5.34)$$

$$\rho_K = \rho_K^0 \left(\frac{a_0}{a} \right)^2 \quad (5.35)$$

$$\rho_c = \frac{3}{8\pi G} H_0^2 \Rightarrow \frac{8\pi}{3} G = \frac{H_0^2}{\rho_c} \quad (5.36)$$

$$\begin{aligned} H^2 &= \frac{H_0^2}{\rho_c} \left[\rho_M^0 \left(\frac{a_0}{a} \right)^3 + \rho_{rad}^0 \left(\frac{a_0}{a} \right)^4 + \rho_\Lambda + \rho_K^0 \left(\frac{a_0}{a} \right)^2 \right] = \\ &= H_0^2 \left[\Omega_M \left(\frac{a_0}{a} \right)^3 + \Omega_{rad} \left(\frac{a_0}{a} \right)^4 + \Omega_\Lambda + \Omega_K \left(\frac{a_0}{a} \right)^2 \right] \end{aligned} \quad (5.37)$$

Уравнение Фридмана в относительных плотностях:

$$\left(\frac{\dot{a}}{a} \right)^2 = H_0^2 \left[\Omega_M \left(\frac{a_0}{a} \right)^3 + \Omega_{rad} \left(\frac{a_0}{a} \right)^4 + \Omega_\Lambda + \Omega_K \left(\frac{a_0}{a} \right)^2 \right] \quad (5.38)$$

Считая $\Omega_{rad} \ll \Omega_M$ найдем q_0 в современную эпоху

$$\left(\frac{\dot{a}}{a} \right)^2 = H_0^2 \left[\Omega_M \left(\frac{a_0}{a} \right)^3 + \Omega_\Lambda + \Omega_K \left(\frac{a_0}{a} \right)^2 \right] \quad (5.39)$$

$$\dot{a} = H_0 \sqrt{\Omega_M a_0^3/a + \Omega_\Lambda a^2 + \Omega_K a_0^2} \quad (5.40)$$

$$\begin{aligned} \ddot{a} &= \frac{H_0}{2} \frac{-\Omega_M a_0^3/a^2 + 2a \Omega_\Lambda}{\sqrt{\Omega_M a_0^3/a + \Omega_\Lambda a^2 + \Omega_K a_0^2}} \dot{a} = \\ &= \frac{1}{2} H_0^2 (2a \Omega_\Lambda - \frac{1}{a^2} \Omega_M a_0^3) \end{aligned} \quad (5.41)$$

(Ω_K ушло!)

$$q_0 = -\frac{1}{H_0^2 a} \Big|_{t_0 \Rightarrow a=a_0} = \frac{1}{2} (\Omega_M - 2\Omega_\Lambda) \quad (5.42)$$

$$q_0 = \frac{1}{2} (\Omega_M - 2\Omega_\Lambda) \quad [\Omega_M = 1, \Lambda = 0 \Rightarrow q_0 = 1/2] \quad (5.43)$$

В каком соотношении находятся Ω_M и Ω_Λ ?

Стандартные свечи и параметр замедления

Наблюдаемая яркость $J(z)$ стандартного источника со светимостью L (эрг/сек):

$$J(z) = \frac{L}{S(z)} \times \frac{1}{1+z} \times \frac{1}{1+z} = \frac{L}{S(z)} \frac{1}{(1+z)^2}$$


покраснение растяжение
времени

(5.44)

$S(z)$ – площадь 2-сферы, окружающей источник.

Растяжение времени:

$$d\eta_i = \frac{dt_i}{a_i} = \frac{dt_0}{a_0} \Rightarrow dt_i = \frac{a_i}{a_0} dt_0 = \frac{dt_0}{1+z} \quad (5.45)$$




$$S(z) = ?$$

$$S(z, \Omega_M, \Omega_\Lambda, \Omega_K) = ?$$

$J(z, \Omega_M, \Omega_\Lambda, \Omega_K)$ – экспериментально измеряемая величина.

Площадь 2-сферы в 3-плоском пространстве, 3-сфере и 3-псевдосфере

1. Длина окружности радиуса ρ на 2-плоскости




$$C_\rho = 2\pi\rho = 2\pi r(\rho) \quad (5.46)$$

$$r(\rho) = a \left(\frac{\rho}{a} \right) = a\chi(\rho) \quad (5.47)$$

a – произвольный масштабный фактор

2. Длина окружности радиуса ρ на 2-сфере




$$C_\rho = 2\pi r(\rho) \quad (5.48)$$

$$r(\rho) = a \sin \left(\frac{\rho}{a} \right) = a \sin \chi(\rho) \quad (5.49)$$

a – радиус

3. Площадь 2-сферы в 3-плоскости



$$S_\rho = 4\pi\rho^2 = 4\pi r^2(\rho) \quad (5.50)$$

$$r(\rho) = a \left(\frac{\rho}{a} \right) = a\chi(\rho) = a\chi(\rho(z)) \quad (5.51)$$

4. Площадь 2-сферы в 3-сфере

$$S_\rho = 4\pi r^2(\rho) \quad (5.52)$$

$$r(\rho) = a \sin \left(\frac{\rho}{a} \right) = a \sin \chi(\rho) = a \sin \chi(\rho(z)) \quad (5.53)$$

5. Площадь 2-сферы в 3-псевдосфере

$$S_\rho = 4\pi r^2(\rho) \quad (5.54)$$

$$r(\rho) = a \operatorname{sh} \left(\frac{\rho}{a} \right) = a \operatorname{sh} \chi(\rho) = a \operatorname{sh} \chi(\rho(z)) \quad (5.55)$$

$$S(z) = 4\pi r^2(z) \quad (5.56)$$

$$r(z) = \begin{cases} a \chi(z) & - \text{3-плоскость} \\ a \sin \chi(z) & - \text{3-сфера} \\ a \operatorname{sh} \chi(z) & - \text{3-псевдосфера} \end{cases} \quad (5.57)$$

$$\chi(z) = \frac{\rho(z)}{a} \quad (5.58)$$

$\chi(z)$ – координатное расстояние от источника, излучившего при красном смещении z (момент времени t_i) до приемника на Земле.

Вычисление $r(z)$

Координатное расстояние до источника, излучившего в момент t_i , и принятого на Земле в момент t_0 :

$$x = \chi = \int_{t_i}^{t_0} \frac{dt}{a(t)}; \quad \chi(z) = ? \quad (5.59)$$

$$z(t) = \frac{a_0}{a(t)} - 1 \Rightarrow dz = -\frac{a_0}{a^2} \dot{a} dt \Rightarrow dt = -\frac{a^2}{a_0 \dot{a}} dz \Rightarrow$$

$$(5.60)$$

$$\chi(z) = \int_z^0 \left(-\frac{a^2}{a_0 \dot{a}} \right) dz \frac{1}{a} = \int_0^z \frac{dz}{a_0 (\dot{a}/a)} =$$

$$= \sqrt{\left(\frac{\dot{a}}{a} \right)^2} = H_0^2 \left[\Omega_M \left(\frac{a_0}{a} \right)^3 + \Omega_\Lambda + \Omega_K \left(\frac{a_0}{a} \right)^2 \right];$$

$$(\text{пренебрегли излучением}); \quad \frac{a_0}{a} = z + 1 \quad (5.61)$$

$$= \int_0^z \frac{dz}{a_0 H_0 \sqrt{\Omega_M (1+z)^3 + \Omega_\Lambda + \Omega_K (1+z)^2}}$$

Результат:

$$\varkappa = 0 :$$

$$r(z) = \frac{1}{H_0} \int_0^z \frac{dz}{\sqrt{\Omega_M(1+z)^3 + \Omega_\Lambda}}; \quad \Omega_M + \Omega_\Lambda = 1 \quad (5.62)$$

$$\varkappa = +1 :$$

$$r(z) = a_0 \sin \left[\int_0^z \frac{dz}{a_0 H_0 \sqrt{\Omega_M(1+z)^3 + \Omega_\Lambda + \Omega_K(1+z)^2}} \right] \quad (5.63)$$

$$\varkappa = -1 :$$

$$r(z) = a_0 \operatorname{sh} \left[\int_0^z \frac{dz}{a_0 H_0 \sqrt{\Omega_M(1+z)^3 + \Omega_\Lambda + \Omega_K(1+z)^2}} \right] \quad (5.64)$$

Можно из П.Ч. исключить H_0 . Для $\varkappa = 0$ легко:

$$\varkappa = 0 :$$

$$H_0 r(z) = \int_0^z \frac{dz}{\sqrt{\Omega_M(1+z)^3 + \Omega_\Lambda}}; \quad \Omega_M + \Omega_\Lambda = 1 \quad (5.65)$$

$H_0 r(z)$ – выражение $r(z)$ в естественных космологических единицах.

$$\begin{aligned} \Omega_K &= \frac{\rho_K^0}{\rho_c} = \frac{1}{\rho_c} \left(-\frac{\varkappa}{a_0^2} \right) \frac{3}{8\pi G} = \\ &= \frac{8\pi G}{3H_0^2} \left(-\frac{\varkappa}{a_0^2} \right) \frac{3}{8\pi G} = -\frac{1}{H_0^2} \frac{\varkappa}{a_0^2} \Rightarrow \end{aligned} \quad (5.66)$$

$$H_0 a_0 = 1 / \sqrt{-\varkappa \Omega_K} \quad (5.67)$$

$$\varkappa = +1 :$$

$$H_0 r(z) = \frac{1}{\sqrt{-\Omega_K}} \sin \left[\int_0^z \frac{\sqrt{-\Omega_K} dz}{\sqrt{\Omega_M(1+z)^3 + \Omega_\Lambda + \Omega_K(1+z)^2}} \right] \quad (5.68)$$

$$\varkappa = -1 :$$

$$H_0 r(z) = \frac{1}{\sqrt{\Omega_K}} \operatorname{sh} \left[\int_0^z \frac{\sqrt{\Omega_K} dz}{\sqrt{\Omega_M(1+z)^3 + \Omega_\Lambda + \Omega_K(1+z)^2}} \right] \quad (5.69)$$

Наблюдаемая яркость


$$J(z) = \frac{L}{S(z)(z+1)^2} = \frac{L}{4\pi[(z+1)r(z)]^2} \Rightarrow \quad (5.70)$$

$$r(z) = \frac{1}{z+1} \sqrt{\frac{L}{4\pi J(z)}} \Rightarrow \quad (5.71)$$

$$H_0 r(z; \Omega_M, \Omega_\Lambda, \Omega_K) = \frac{H_0}{z+1} \sqrt{\frac{L}{4\pi J(z)}} \quad (5.72)$$


Яркостное расстояние: $D_L = (z+1)r(z)$.

Если есть «стандартная свеча» L , то $H_0 r(z)$ можно измерить.



В плоской вселенной при больших Λ при одном и том же z расстояние $r(z)$ больше – сверхновые тусклее.

Стандартные свечи – сверхновые типа Ia.



A.G. Riess et. al. The Astronomical Journal, 116 : 1009-1038, 1998.

$M - m$ – светимость (чем больше, тем тусклее)
Эксперимент не согласуется с предположением, что Вселенная заполнена только материей.

Назад к параметру замедления

Во втором порядке по z ★

$$r(z) \cong \frac{1}{H_0} \left[z - \frac{z^2}{2} \left(1 + \frac{\Omega_M - 2\Omega_\Lambda}{2} \right) \right] \quad (5.73)$$

Из (5.42):


$$q_0 = \frac{\Omega_M - 2\Omega_\Lambda}{2} \Rightarrow \quad (5.74)$$

$$r(z) \cong \frac{1}{H_0} \left[z - \frac{z^2}{2} (1 + q_0) \right] \quad (5.75)$$

q_0 определяется прямо по кривой $r(z)$, $q_0 < 0 \Rightarrow$ не замедление, а ускорение!

Имеется приблизительное вырождение по Ω_M и Ω_Λ при малых $z \Rightarrow$

Чем больше z , тем точнее определение q_0 .



A.G. Riess et. al. The Astronomical Journal, 116 : 1009-1038, 1998.

Ограничения на Ω_M и Ω_Λ по одним только сверхновым Ia.

Нобелевская 2011 г.:
Сол Перлмуттер, Брайан Шмидт, Адам Рисс.

Нельзя ли найти стандартные свечи погрече?

Можно ли использовать гамма-барстера как стандартные свечи при больших z ?

Mon. Not. R. Astron. Soc. 000, 1–7 (2015) Printed August 21, 2015 (MN LaTeX style file v2.2)

Arc long gamma-ray bursts standard candles?

Hai-Nan Lin^{1*}, Xin Li^{1,2†}, Sai Wang^{2‡} and Zhe Chang^{3§}

¹Department of Physics, Chongqing University, Chongqing 401331, China

²State Key Laboratory Theoretical Physics, Institute of Theoretical Physics, Chinese Academy of Sciences, Beijing 100190, China

³Institute of High Energy Physics, Chinese Academy of Sciences, Beijing 100049, China

Accepted xxxx; Received xxxx; in original form xxxx

ABSTRACT

Gamma-ray bursts (GRBs) are widely proposed as an effective probe to trace the Hubble diagram of the Universe in high redshift range. However, the calibration of GRBs is not as easy as that of type-Ia supernovae (SNe Ia). Most calibrating methods at present make use one or some of the empirical luminosity correlations, e.g., Amati relation. One of the underlying assumptions of these calibrating methods is that the empirical correlation is universal over all redshifts. In this paper, we check to what extent this assumption holds. Assuming that SNe Ia exactly trace the Hubble diagram of the Universe, we re-investigate the Amati relation for low redshift ($z < 1.4$) and high redshift ($z > 1.4$) GRBs, respectively. It is found that the Amati relation of low- z GRBs differs from that of high- z GRBs at more than 3σ confidence level. This result is insensitive to cosmological models. We should be cautious when using Amati relation to reconstruct the Hubble diagram of the Universe.

Key words: cosmological parameters – gamma-ray burst: general – supernovae: general

1 INTRODUCTION

Gamma-ray bursts (GRBs) are the most luminous explosions in the Universe since the big bang. The isotropic equivalent energy they released in a few seconds can be as large as $10^{48} \sim 10^{55}$ ergs. For recent reviews, see, e.g., [Piran (1999); Mészáros (2002, 2006); Kumar & Zhang (2015)]. Thanks to their extreme brightness, GRBs are detectable up to redshift $z \gtrsim 9$ (Salvaterra (2015)). For example, the most distant GRB known today is GRB 090429B, whose redshift is as high as $z \approx 9.4$ (Cucchiara et al. 2011). Due to their high redshift properties, GRBs are often proposed as potential candles to trace the Hubble diagram of the Universe in the high redshift range. In fact, GRBs have already been widely used, together with other candles, such as type-Ia supernovae (SNe Ia), to constrain the cosmological parameters [Schaefer (2003); Bloom, Frail & Kulkarni (2003); Xu, Dai & Liang (2005); Firmani et al. (2005); Liang & Zhang (2005); Firmani et al. (2006a); Schaefer (2007); Liang et al. (2008); Liang & Zhang (2008); Wei & Zhang (2009); Wei (2010); Wang, Qi & Dai (2011); Capozziello et al. (2012); Wei, Wu & Melia (2013); Velten, Montiel & Carneiro (2013); Cai et al. (2013); Bretón & Montiel (2013); Chang et al. (2014); Cano & Jakobsson (2014); Cuzinatto, Medeiros & de Moraes (2014); Wang & Wang (2014); Wang, Dai & Liang (2015); Li, Ding & Zhu (2015)]. The consistent luminosities of SNe Ia make them the ideal distance indicators in tracing the Hubble diagram of the local (low-redshift) universe. However, since we have little knowledge about the explosion mechanism of GRBs, the GRB candle is much less standard than the SN Ia candle.

Nevertheless, one can still calibrate GRBs using the empirical luminosity correlations found in long GRBs. These correlations includes Amati relation ($E_{\text{peak}} - E_{\text{liso}}$) (Amati et al. 2002; Amati (2003, 2006)), Ghirlanda relation ($E_{\text{peak}} - E_{\gamma}$) (Ghirlanda, Ghisellini & Lazzati (2004)), Yonetoku relation ($E_{\text{peak}} - L_{\text{liso}}$) (Yonetoku et al. 2004), Liang-Zhang relation ($t_b - E_{\text{peak}} - E_{\text{liso}}$) (Liang & Zhang (2005)), Firmani relation ($T_{0.45} - E_{\text{peak}} - L_{\text{liso}}$) (Firmani et al. 2006b), lag-luminosity relation

* e-mail: linhn@ihep.ac.cn.

† e-mail: lixin1981@cqu.edu.cn.

‡ e-mail: wangsa@itp.ac.cn.

§ e-mail: changz@ihep.ac.cn.

© 2015 RAS

Пока есть проблемы.

ΛCDM-модель – стандартная модель космологии

ΛCDM – Λ Cold Dark Matter

(Некоторые) параметры стандартной модели

$$\Omega_M = 0.309 \pm 0.006 \quad (\Omega_B \approx 0.05, \Omega_{CDM} \approx 0.26) \quad (5.76)$$

$$\Omega_\Lambda = 0.691 \pm 0.006 \quad (5.77)$$

$$\Omega_{rad} \lesssim 10^{-4} \quad (5.78)$$

$$|\Omega_K| < 0.005 \quad (5.79)$$

$$h = 0.6766 \pm 0.0042 \quad (5.80)$$

$$w = -1.006 \pm 0.045 \quad (5.81)$$

1. Уравнение состояния темной энергии:

$$p = w\rho \quad (5.82)$$

$w = -1 \Rightarrow$ темная энергия есть в точности вакуумный космологический член. Иначе «квинтэссенция» ($w > -1$, скалярное поле) или «фантомная энергия» ($w < -1$, непонятно что \Rightarrow Большой разрыв, Big Rip).

2. Оценка Ω_{rad}

$$\Omega_\gamma = \frac{\rho_\gamma}{\rho_c} \quad (5.83)$$

«Закон Стефана-Больцмана»

$$\rho_\gamma = 2 \frac{\pi^2}{30} T_0^4, \quad T_0 = 2.725 \text{ K}^\circ \quad (5.84)$$

$$\rho_c = \frac{3}{8\pi G} H_0^2; \quad h = 0.68 \Rightarrow \quad (5.85)$$

$$\Omega_\gamma = 0.53 \cdot 10^{-4} \Rightarrow \Omega_{rad} \simeq 10^{-4} \quad (5.86)$$

(Проверьте ★)

Основные фазы эволюции Вселенной

Уравнение Фридмана:

$$\left(\frac{\dot{a}}{a}\right)^2 = H_0^2 \left[\Omega_M \left(\frac{a_0}{a}\right)^3 + \Omega_{rad} \left(\frac{a_0}{a}\right)^4 + \Omega_\Lambda + \Omega_K \left(\frac{a_0}{a}\right)^2 \right] \quad (5.87)$$

1. При $a \rightarrow 0$ доминирует радиационный член Ω_{rad}
 \Rightarrow
 радиационно-доминированная стадия, эра доминирования ультрарелятивистской материи, «Горячий Большой взрыв»
2. Потом доминирует член Ω_M
 \Rightarrow
 эра доминирования (холодной нерелятивистской) материи, эра пылевидной материи
3. Эры доминирования кривизны нет, хотя могла бы быть, но Ω_K мало, а Ω_Λ , наоборот, велико.
4. Потом доминирует член Ω_Λ
 \Rightarrow
 эра Де Ситтера

В первом приближении есть всего три основные фазы эволюции, связанные соответственно с $\Omega_{rad}, \Omega_M, \Omega_\Lambda$.

От радиационно-доминированной стадии к стадии холодной материи

$$\left(\frac{\dot{a}}{a}\right)^2 = \frac{8\pi}{3} G \rho_c \left[\Omega_M \left(\frac{a_0}{a}\right)^3 + \Omega_{rad} \left(\frac{a_0}{a}\right)^4 \right] \quad (5.88)$$

$$\Omega_M \left(\frac{a_0}{a}\right)^3 \sim \Omega_{rad} \left(\frac{a_0}{a}\right)^4 \Rightarrow a_{eq} \quad (5.89)$$

$$\frac{a_0}{a_{eq}} \sim \frac{\Omega_M}{\Omega_{rad}} \sim \frac{0.3}{10^{-4}} = 1 + z_{eq} \Rightarrow \quad (5.90)$$

$$z_{eq} \sim 3 \cdot 10^3 \quad (5.91)$$

$$\frac{T_{eq}}{T_0} = 1 + z_{eq} \Rightarrow T_{eq} = T_0(1 + z_{eq}) \approx 10^4 \text{ K}^\circ \sim 1 \text{ эВ} \quad (5.92)$$

Как найти время t_{eq} ?

Не совсем просто, через современную температуру и H_{eq} .

«Закон Стефана-Больцмана» для фотонов и нейтрино (других УР частиц нет):

$$\rho_{rad} = \frac{\pi^2}{30} g_* T^4 \quad (5.93)$$

g_* – эффективное число степеней свободы (стат. вес) фотонов и нейтрино:

$$g_* = 2 + \frac{21}{4} \left(\frac{4}{11}\right)^{4/3} \approx 3.36 \text{ (получим потом)} \quad (5.94)$$

$$\left(\frac{\dot{a}}{a}\right)^2 = \frac{8\pi}{3} G \rho \quad (5.95)$$

$$T = (1 + z)T_0 \quad (5.96)$$

$$\begin{aligned} H_{eq} &= \sqrt{\frac{8\pi}{3} G \rho} = \sqrt{\frac{8\pi}{3} G 2\rho_{rad}} = \sqrt{\frac{8\pi}{3} G 2 \frac{\pi^2}{30} g_* T^4} = \\ &= T^2 \sqrt{2} \sqrt{\frac{8\pi^3}{90} g_* \frac{1}{M_{Pl}^2}} = \frac{T^2}{M_{Pl}^*} \sqrt{2} = \frac{[(1 + z_{eq})T_0]^2}{M_{Pl}^*} \sqrt{2} \end{aligned} \quad (5.97)$$

$$M_{Pl}^* = \frac{M_{Pl}}{\sqrt{\frac{8\pi^3}{90} g_*}} \quad (5.98)$$

На радиационно-доминированной стадии

$$t_{eq} = \frac{1}{2H_{eq}} = \frac{1}{2} \frac{M_{Pl}^*}{[(1 + z_{eq})T_0]^2} \sqrt{2} \approx 120000 \text{ лет} \quad (5.99)$$

От доминирования материи к фазе Де Ситтера – от замедления к ускорению

Ищем точку перегиба $a(t)$:

$$\left(\frac{\dot{a}}{a}\right)^2 = \frac{8\pi}{3} G \rho_c \left[\Omega_M \left(\frac{a_0}{a}\right)^3 + \Omega_\Lambda \right] \quad (5.100)$$

$$\dot{a}^2 = \frac{8\pi}{3} G \rho_c \left(\Omega_M \frac{a_0^3}{a} + \Omega_\Lambda a^2 \right) \quad (5.101)$$

$$2\dot{a}\ddot{a} = \frac{8\pi}{3} G \rho_c \left(-\Omega_M \frac{a_0^3}{a^2} \dot{a} + 2a\dot{a}\Omega_\Lambda \right) \quad (5.102)$$

$$\ddot{a} = 0 \Rightarrow \left(\frac{a_0}{a}\right)^3 = \frac{2\Omega_\Lambda}{\Omega_M} \quad (5.103)$$

$$z = \frac{a_0}{a} - 1 = \sqrt[3]{\frac{2\Omega_\Lambda}{\Omega_M}} - 1 = \sqrt[3]{\frac{2 \cdot 0.69}{0.31}} - 1 = 0.65 \quad (5.104)$$

$$t = ?$$

Решение для $\Omega_M, \Omega_\Lambda \neq 0$, $\Omega_K = \Omega_{rad} = 0$

$$\left(\frac{\dot{a}}{a}\right)^2 = H_0^2 \left[\Omega_M \left(\frac{a_0}{a}\right)^3 + \Omega_\Lambda \right], \quad \Omega_M + \Omega_\Lambda = 1 \quad (5.105)$$

Проверяется подстановкой:

$$a(t) = a_0 \left(\frac{\Omega_M}{\Omega_\Lambda} \right)^{1/3} \left[\operatorname{sh} \left(\frac{3}{2} \sqrt{\Omega_\Lambda} H_0 t \right) \right]^{2/3} \quad (5.106)$$

$$\frac{a_0}{a(t)} = z + 1 = \frac{(\Omega_\Lambda/\Omega_M)^{1/3}}{\left[\operatorname{sh}\left(\frac{3}{2}\sqrt{\Omega_\Lambda}H_0t\right)\right]^{2/3}} \Rightarrow \quad (5.107)$$

$$t = \frac{2}{3H_0\sqrt{\Omega_\Lambda}} \operatorname{arsh} \left[\left(\frac{1}{z+1} \right)^{3/2} \sqrt{\frac{\Omega_\Lambda}{\Omega_M}} \right] \quad (5.108)$$

Возраст Вселенной

$$z = 0 \Rightarrow t_0 = \frac{2}{3H_0\sqrt{\Omega_\Lambda}} \operatorname{arsh} \left(\sqrt{\frac{\Omega_\Lambda}{\Omega_M}} \right) \quad (5.109)$$

$$\Omega_\Lambda = 0.691, \Omega_M = 0.309, h = 0.678 \Rightarrow$$

$$t_0 = 13.80 \cdot 10^9 \text{ лет} \quad (5.110)$$

Возраст перехода от замедления к ускорению

$$z + 1 = 1.65 \Rightarrow t = 7.61 \cdot 10^9 \text{ лет} \quad (5.111)$$

$$t_0 - t = 6.2 \cdot 10^9 \text{ лет} \quad (5.112)$$

Красное смещение - возраст - расстояние

z	t, Gy	t _{0-t} , Gy	R, Gly
0.01	13.66	0.1433	0.144
0.01259	13.62	0.18	0.1812
0.01585	13.57	0.2261	0.2279
0.01995	13.51	0.2838	0.2866
0.02512	13.44	0.3559	0.3604
0.03162	13.35	0.446	0.453
0.03981	13.24	0.5582	0.5692
0.05012	13.1	0.6975	0.7148
0.0631	12.93	0.8701	0.8971
0.07943	12.72	1.083	1.125
0.1	12.46	1.344	1.409
0.1259	12.14	1.661	1.763
0.1585	11.75	2.045	2.201
0.1995	11.29	2.504	2.742
0.2512	10.75	3.047	3.407
0.3162	10.12	3.677	4.216
0.3981	9.401	4.397	5.193
0.5012	8.597	5.201	6.357
0.631	7.724	6.075	7.724
0.7943	6.803	6.996	9.299
1	5.865	7.934	11.07
1.259	4.946	8.853	13.03
1.585	4.08	9.719	15.12
1.995	3.294	10.5	17.3
2.512	2.608	11.19	19.52
3.162	2.028	11.77	21.73
3.981	1.552	12.25	23.89
5.012	1.172	12.63	25.97
6.31	0.875	12.92	27.93
7.943	0.6468	13.15	29.77
10	0.4743	13.32	31.47